

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Essitol[®] Tabletten 1000 mg

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren.

Wirkstoff: Aluminiumacetat-Tartrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Essitol[®] und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Essitol[®] beachten?
3. Wie ist Essitol[®] anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Essitol[®] aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Essitol[®] und wofür wird es angewendet?

Essitol[®] ist ein traditionelles Arzneimittel.

Anwendungsgebiet:

Essitol[®] wird traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Prellungen und Verstauchungen sowie als mild wirkendes Arzneimittel bei übermäßiger Schweißbildung.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Essitol[®] beachten?

Essitol[®] darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch auf Aluminiumacetat-Zubereitungen oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Essitol[®] sind.

Die Lösung darf nicht auf offene Wunden aufgetragen werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Essitol[®] anwenden.

Die Tabletten müssen vor der Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, aufgelöst und verdünnt werden. Sollten die Beschwerden bei Verstauchungen und Prellungen länger als 1 Woche andauern, ist ein Arzt aufzusuchen.

Essitol[®] nicht mit Augen und Schleimhäuten in Berührung bringen.

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von Essitol[®] mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Bei der gleichzeitigen Anwendung weiterer äußerlich anzuwendenden Produkte kann es zu Wechselwirkungen kommen. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor Kurzem angewendete Arzneimittel gelten können.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach. Es liegen keine Daten über die Verwendung von Essitol[®] bei Schwangeren und in der Stillzeit vor, so dass eine Anwendung nicht empfohlen wird. In jedem Falle darf in der Stillzeit keine Anwendung im Brustbereich erfolgen.

Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie ist Essitol[®] anzuwenden?

Wenden Sie Essitol[®] immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Für Umschläge und kühlende Verbände bei Prellungen und Verstauchungen nehmen Sie bitte 1-2 Tabletten und lösen diese in einem Glas lauwarmen Wasser (ca. 100 bzw. 200 ml) auf. Mit der entstehenden Lösung tranken Sie den Umschlag. Lassen Sie den Umschlag nicht austrocknen und wechseln Sie ihn spätestens nach 2 Stunden.

Zur Verminderung einer übermäßigen Schweißbildung nehmen Sie bitte 1-2 Tabletten und lösen diese in einem Glas (ca. 20 bzw. 40 ml) lauwarmen Wasser auf. Mit dieser Lösung bepinseln oder betupfen Sie dann die betroffenen Hautpartien.

Art der Anwendung:

Essitol[®] ist ausschließlich zur Bereitung einer Lösung zum äußerlichen Gebrauch, wie vorhergehend beschrieben, bestimmt und darf nicht eingenommen werden.

Dauer der Anwendung:

Umschläge mit verdünnter Lösung sollten nur bis zum Abklingen der akuten Prellungs- und Verstauchungsbeschwerden angewendet werden. Sollten die Beschwerden bei Prellungen und Verstauchungen länger als 1 Woche andauern, ist ein Arzt aufzusuchen.

Die mit Essitol® hergestellten Lösungen zum Bepinseln oder Betupfen bei übermäßiger Schweißbildung können langfristig angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Essitol® zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Essitol® angewendet haben, als Sie sollten:

Bei Anwendung ungenügend verdünnter Lösungen oder bei langfristiger Anwendung zu Umschlägen, insbesondere unter Luftabschluß, besteht die Gefahr von Hautschädigungen, unter Umständen bis zur Ausbildung von schweren Gewebeschädigungen.

Wenn Sie die Anwendung von Essitol® vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Führen Sie bitte die Behandlung so bald wie möglich, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Wenn Sie die Anwendung von Essitol® abbrechen:

Essitol® wird nur bei Bedarf angewendet.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Essitol® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei Jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<i>Sehr häufig:</i>	mehr als 1 von 10 Behandelten
<i>Häufig:</i>	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<i>Gelegentlich:</i>	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
<i>Selten:</i>	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
<i>Sehr selten:</i>	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen

Bei Anwendung ungenügend verdünnter Lösungen oder bei langfristiger Anwendung zu Umschlägen, insbesondere unter Luftabschluß, besteht die Gefahr von Hautschädigungen, unter Umständen bis zur Ausbildung von schweren Gewebeschädigungen.

In sehr seltenen Fällen können allgemeine, milde, unspezifische Symptome wie vorübergehendes Brennen auf der Haut, lokale Reizungen, lokale allergische Reaktionen (Kontaktdermatitis) und Gehörschädigung (Ototoxizität) auftreten. Bei den ersten Anzeichen von Hautveränderungen oder einer Überempfindlichkeitsreaktion ist die Behandlung mit Essitol® sofort abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Essitol® aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25 °C lagern.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Essitol® enthält:

Der Wirkstoff ist: 1 Tablette enthält 1,0 g Aluminiumacetat-Tartrat, entsprechend 128 mg Aluminium-Ionen.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Macrogol 20000, Macrogol 6000, Croscarmellose-Natrium, hydriertes Ricinusöl, hochdisperses Siliciumdioxid.

Wie Essitol® aussieht und Inhalt der Packung:

Essitol® sind weiße Tabletten und in Blistern aus PVC und Aluminium in Faltschachteln zu 10 Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

athenstaedt GmbH & Co KG, Am Beerberg 1, 35088 Battenberg

Tel.: +49 6452 929 42-0, Fax: +49 6452 929 42-15

E-Mail: pharma@athenstaedt.de

Hersteller

Klocke Pharma-Service GmbH, Straßburger Straße 77, 77767 Appenweier

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2013.

Eigenschaften

Essitol® Tabletten lassen sich problemlos auflösen und anwenden und sind hautverträglich. Die äußerlich anzuwendende Lösung wird aufgrund langjähriger Erfahrung bei Prellungen und Verstauchungen angewendet und hat sich überall dort bewährt, wo mit genannten Verletzungen zu rechnen ist, wie z. B. beim Wandern, Bergsteigen, Camping, bei Jagd und Angelsport oder anderen sportlichen Betätigungen. Auf Grund ihrer handlichen Packungsgröße lassen sich Essitol® Tabletten bequem im Reisegepäck mitführen.

Damit Sie stets auf die Ihnen gegebenen Informationen zurückgreifen können, legen Sie bitte nach der Anwendung diese Gebrauchsinformationen zusammen mit den Tabletten wieder in die Faltschachtel zurück.